

Основное действующее вещество – **Дапоксетин** и **Силденафил**

Показания к применению:

Препарат **SUPER P-FORCE** предназначен для лечения преждевременной эякуляции (раннего семяизвержения) и лечения нарушений эректильной функции (эрекции) у мужчин.

Способ применения:

Примите препарат примерно за 60-90 минут до полового акта и запейте его небольшим количеством воды. Прием жирной пищи и алкогольных напитков перед приемом **SUPER P-FORCE** не рекомендуется.

Дозировка:

Рекомендуемая доза препарата 1 таблетка в сутки. По назначению лечащего врача, доза может быть увеличена или уменьшена.

Действие:

SUPER P-FORCE селективный ингибитор обратного захвата серотонина (SSRI). SSRI блокирует рецепторы в коре головного мозга, поглощая серотонин, действуя избирательно и задерживая эякуляцию. В отличие от других препаратов селективного действия, эффект от приема которых достигается через 2 недели, **Дапоксетина гидрохлорид** начинает действовать с первого приема.

Продолжительность воздействия на организм от 3 до 4 часов, за это время концентрация **Дапоксетина** в крови снижается на 50% от первоначальной. Таким образом, оптимальный эффект достигается в течение от 60 до 90 минут после приема препарата.

Противопоказания:

Не рекомендуется применять препарат, при:

- Аллергии на Дапоксетин, Силденафил и другие ингредиенты препарата;
- Циррозе печени (серьезной болезни печени);
- Сердечной недостаточности, аритмии или других проблем с сердцем;
- Индивидуальной непереносимости действующего вещества – Силденафила;
- Постоянном приеме или с перерывами донаторов оксида азота, органические нитраты или нитраты в любых формах, поскольку Силденафил усиливает гипотензивное действие нитратов;
- Заболеваниях, предрасполагающих к развитию серповидно-клеточной анемии, множественной миеломе, лейкозу, тромбоцитопению);
- Заболеваниях, сопровождающихся кровотечением;
- Обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
- Наследственном пигментном ретините;
- Почечной или печеночной недостаточности;
- Нестабильной стенокардии, перенесенном в последние 6 мес инфаркте миокарда, инсульте, тяжелых, угрожающих жизни аритмиях, артериальной гипертензии (АД более 170/100 мм рт.ст.) или гипотензии (АД менее 90/50 мм рт.ст.);
- Запрещено применять препарат детям и подросткам до 18 лет, а также женщинам;
- С осторожностью следует применять препарат при анатомической деформации полового члена.

Нельзя принимать SUPER P-FORCE с любыми из следующих препаратов:

- Антидепрессанты;
- Препараты, применяемые при лечении шизофрении;
- Препараты для лечения биполярного расстройства (Керри Катона);
- Linezolid – антибиотик;
- Триптофан – снотворное;
- Зверобой – фитотерапия;
- Трамадол - сильное болеутоляющее;
- Препараты, применяемые для лечения мигрени.

Вам нужно проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать SUPER P-FORCE, если:

- У Вас были когда-нибудь расстройства психического порядка;
- У Вас проблемы свертывания крови, болезни почек, эпилепсия или головокружение, низкое кровяное давление.

Возможные побочные действия:

- Тошнота;
- Головная боль;
- Диарея;
- Головокружение, головная боль;
- Прилив крови к лицу;
- Головокружение;
- Учащенное сердцебиение;
- Заложенность носа.

Если Вы почувствовали головокружение, тошноту или какой-либо другой неприятный эффект, прекратите прием препарата, и проконсультируйтесь с врачом!